園芸

営農 今月の

ネギの定植から定植後の管理について

秋田地区営農センター 長谷川 弘幸

今年は現在のところ、気温の温度差がありますので、生育が緩慢となり病気の発生が予想されます。殺菌剤を使った防除は必ず行いましょう！

●定植時の管理について

病害虫対策 小菌核腐敗病、タマネギバエ、タネバエ、ネキリムシ類の防除対策には、スタークル顆粒水溶剤とベンレート水和剤の苗箱灌注処理が効果的です。

小菌核腐敗病 ＋ **タマネギバエ、タネバエ、ネキリムシ類（同時防除）**

↓ ↓

ベンレート水和剤（500倍） **スタークル顆粒水溶剤（50倍）**

ダシ80枚（10ａ分よりやや多め）に500ml／1ダシ灌注する場合、薬液40ℓを準備する

↓

40ℓにスタークル顆粒水溶剤800ｇを溶かす

↓

スタークルを溶かしたものに、ベンレート水和剤80ｇを溶かす

↓

定植当日、朝ごはん前に灌注しておく。余分な水分が抜けたら定植する

※トップジンM水和剤を使用する場合は、250倍で1ℓ／1ダシの灌注となります。

●病害虫防除体系案

定 植 時	→	定植30日後	→	定植60日後
スタークル（顆）もしくはジュリボフロアブル ＋ ベンレート（水）もしくはトップジンM（水） 苗箱灌注処理		ダントツ（粒） 株元散布		殺虫剤散布

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	使用回数	ネギアザミウマ	ネギハモグリバエ	タマネギバエ	タネバエ
ジュリボフロアブル	200倍 （セル成形育苗トレイ1箱または ペーパーポット1冊あたり500ml）	灌 注	育苗期後半 ～定植当日	1回	○	○	○	○
スタークル 顆粒水溶剤	50倍 （セル成形育苗トレイ1箱または ペーパーポット1冊あたり500ml）		定植前日 ～定植時		○	○		○

★今月のあなたの運勢 2019年5月★ 乙女座（8.23～9.22） 行動範囲が広がる予感。気になることは即やってみるのが成功の鍵。SNSでの情報収集にもつきがあります