



男鹿地区営農センター 鈴木 拓馬

6月は天候が崩れやすく、曇天や雨天が続く可能性があります。日照時間の変化などの環境に応じた管理を心掛けましょう。

施設

お盆向けの施設の「岩の白扇」については、消灯管理の時期に入ります。

●管理の例

※あくまでも目安になります。状況に応じた管理を行って下さい。

- ①消灯 …………… 6/16 (草丈50cm、展開葉23枚以内)
- ②追肥 …………… 6/21 (再電開始時期の2～3日前、窒素分1.5kg/100坪)
- ③再電照 ……… 6/24 (消灯の8日後から5日間、23時～4時までの5時間 但し天候により変わる)
- ④Bナイン …… 6/29 (再電照終了直後 8g/100坪 草丈長め、細めの場合のみ)
- ⑤Bナイン …… 7/8 (発蕾確認直後 16g/100坪 消灯の20日～25日後)
- ⑥Bナイン …… 7/16 (摘蕾直後 20g/100坪)
- ⑦収穫 …………… 8/5 (消灯の約48日切り始め、50日で最盛期、55日で終了)

※収穫目標の20日前には摘蕾を終わらせましょう。

露地

雨天後の好天により、急激に草丈が伸長することがあります。その際、土壌中のカルシウム不足から、カルシウム欠乏症「チップバーン(葉先枯れ)」の発生が懸念されます。予防策として週1回の間隔でカルシウム補給剤(例:カルハード 1,000倍)を散布してください。施設内については、急激な伸長を抑えるためにBナインや送風も効果があります。



カルハード▶

病虫害防除薬剤例(お盆向け)

症状	薬剤名	希釈倍率
アザミウマ・アブラムシ防除	ダントツ水溶剤 	2,000倍
	ジェイエース水溶剤  ◀ダントツ	1,000倍
ダニ防除	ダニトンフロアブル	1,000倍
	コロマイト乳剤  ◀コロマイト	1,500倍
	カネマイトフロアブル	1,000倍
白さび防除	チルト乳剤25 	3,000倍
	アフエットフロアブル  ◀チルト	2,000倍