



園芸

Point

夏ネギの定植目前! 適期の病害虫防除に努めましょう



男鹿地区営農センター センター長補佐 玉尾 徳彦

夏ネギの定植期を迎えました。高品質なネギを出荷するため、作業の適期や病害虫の防除体系について確認しておきましょう。

大苗(7月中旬から収穫の場合)作業時期の目安と発生しやすい病害虫

時期	4月		5月		6月		7月	
	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半
作業	定植		削り込み 1回目	土寄せ 1回目	土寄せ 2回目	土寄せ 3回目	土寄せ 4回目	収穫※
発生しやすい病害虫						小菌核腐敗病		
						べと病		
						さび病		
						白絹病、軟腐病		
						黒斑病、葉枯病		
						初期害虫(ネキリムシ、タマネギバエ、タマバエ)		
						ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ		

※収穫遅れば軟腐病が発生しやすくなるため、注意してください。

病害虫防除

被害が出てからでは、十分な薬剤の効果が得られないことがあります。日頃から圃場をよく確認し、初期防除に努めてください。また、収穫前日数に注意して使用しましょう。

対象病害	殺菌剤	系統	対象害虫	殺虫剤	系統
小菌核腐敗病	ベンレート水和剤 (定植前、苗箱灌注)	H	タネバエ アザミウマ類	スタークル顆粒水溶剤 (定植前日～ 定植時苗箱灌注)	g
べと病 さび病 黒斑病	※定植時期が早かったり、 べと病などが発生しやすい 気象の場合(5月前半) ベンコゼブフロアブル(14日前)	B	ネギハモグリバエ アザミウマ類 ネギコガ	ダイアジノン乳剤40 (21日前)	a
軟腐病	オリゼメート粒剤 (30日前)	V	ネギコガ ネギハモグリバエ アザミウマ類 シロイチモジョトウ	ディアナSC(前日)	j
べと病 葉枯病	プロポーズ顆粒水和剤 (14日前)	E・T	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	ダントツ水溶剤(3日前)	g
べと病 さび病 黒斑病	ベンコゼブフロアブル (14日前)	B	アザミウマ類 シロイチモジョトウ ネギコガ ネギハモグリバエ	グレーシア乳剤(7日前)	l
黒斑病 葉枯病 べと病 さび病	アミスター20フロアブル(3日前) または メジャーフロアブル(前日) ※混用できません	S	アブラムシ類 シロイチモジョトウ ネギコガ	ハチハチ乳剤(7日前)	l・w
除草剤			ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	リーフガード顆粒水和剤 (7日前)	d
ゴーゴーサン乳剤(定植後※定植10日後まで)			アザミウマ類 ネギハモグリバエ	ファインセーブフロアブル (3日前)	l
トレファノサイド乳剤(収穫30日前まで)					

★今月のあなたの運勢 2022年3月★ 蟹座 (6.22~7.22) 渡りに船の話が舞い込みそう。活動的なほどラッキーに巡り合えます。セミナー参加や旅行の計画を立てて吉