



Point

## 良質な秋冬ネギを収穫するため、 稲刈り前後も防除の徹底を!


今月  
**営  
ポイ**



秋田地区営農センター 主任 澤田石 仁

9月はネギの生育が活発な一方で、稲刈り時期と重なるため防除作業が疎かになりがちです。稲刈り前から最後まで病害対策を徹底し、良質な秋冬ネギの収穫を目指しましょう。

### 9~10月に多発しやすい病害



黒斑・さび病の症状が生じたねぎ

葉先の傷みや害虫による食害で傷んだ箇所から、カビ(黒斑)が発症して増殖し、黄色斑紋病斑も蔓延します。

#### ●さび病

いちど発症すると広がりが早い病害です。さび色の斑点を確認したら、直ちに薬剤を散布しましょう。昨年多発した圃場や多肥条件で発生しやすい傾向があるため、多量の追肥には十分注意し、毎年さび病が現れる場合は施肥量を検討してください。

#### ●黄色斑紋病斑(葉枯病)

葉に黄色のまだら症状ができ、品質の低下に繋がります。9月下旬以降の発生が特に多いため、9月上旬から10月上旬に約10日間隔で、重点的に防除を行きましょう。

### 効果的な殺菌剤

使用時期	薬剤名	系統	適用病害虫	使用回数	使用期限
9月中旬	テーク水和剤	マンゼブ・EBI剤	黒斑病、さび病、葉枯病、べと病	マンゼブ系統※ 3回以内	収穫14日前
9月下旬	パレード20フロアブル	ピラジフルミド	黒斑病、さび病、葉枯病	3回以内	収穫前日
10月上旬	メジャーフロアブル アミスター20フロアブル	ストロビルリン	黒斑病、さび病、葉枯病、べと病		

※マンゼブ系統…リドミルゴールドMZ、ペンコゼブフロアブル、ジマンダイセン水和剤など

薬剤名	系統	適用病害虫	使用回数	使用期限	ポイント
ヨネポン水和剤	ノニルフェノール スルホン酸銅	黒斑病、さび病、軟腐病、べと病	4回以内	収穫7日前	病斑などが少ない場合、 収穫2週間前に散布すると、 収穫前のネギがきれいに仕上がります
カナメフロアブル	SDHI	黒斑病、さび病、黒腐菌核病、白絹病		収穫前日	秋冬時期の黒斑病、さび病治療剤

**同一薬剤の連用を控えて別系統剤を散布することで、耐性菌を防ぎましょう!**