



今月
営
ポイ

園芸
ポイント

秋冬どりの小松菜・ホウレンソウの
品種特性・防除を確認しましょう!



秋田地区営農センター 長門 雄生

小松菜

●栽培・収穫管理の注意点

9月下旬頃に播種した場合、低温期の栽培では、トンネルやべたがけ資材などで保温しましょう。冬期は伸長が緩やかですが、低温期を経過して花芽が形成されるため、初春の気温上昇とともにとう立ち、脇芽が伸長して品質が落ちる恐れがあります。収穫が遅れないように注意してください。

●品種特性

- 里しずく** 白さびに強く、味がよい。
- ちぢみ小松菜** 食味がよく、縮んだ葉が特徴。
- CR大河小松菜** 根こぶに強い。株張りがよく、収量性が高い。
- 河北小松菜** 根こぶに強く、低温期でも成長が早い。

ホウレンソウ

●栽培・収穫管理の注意点

気温が低下してくると生育が安定するため、幅広い品種の栽培ができます。秋雨によってべと病が発生したり、気温が急速に下がったりする年もあるため、べと病抵抗性や低温伸長性を考慮して品種を選定しましょう。

秋冬に収穫する場合は、9月から10月中旬までが播種の適期になります。発芽むらを防ぐために、散水を均一に行うことがポイントです。

●品種特性

- 福兵衛** 葉柄が太く、株張りのいい多収品種。伸長性が低い。
※べと病抵抗性レース…1~12、14~16、19
- 伸兵衛** 葉肉が厚く、葉柄が折れにくい。収穫や調製作業が容易で、伸長性が高い。
※べと病抵抗性レース…1~12、14~16、19

病害虫・雑草対策

対象作物	分類	農薬名	使用時期	回数	希釈倍率または使用量
小松菜	殺虫剤	ゼンターリ顆粒水和剤	発生初期 ただし収穫前日まで	—	1,000~2,000倍
		スピノエース顆粒水和剤	収穫14日前まで	2	2,500~5,000倍
	除草剤	カスケード乳剤	収穫7日前まで	2	2,000倍
ホウレンソウ	殺虫剤	ラッソー乳剤	播種直後	1	50~100ml/10a
		フォース粒剤	播種前	1	9kg/10a
	殺菌剤	カスケード乳剤	収穫3日前まで	3	4,000倍
		レーバスフロアブル	収穫3日前まで	2	2,000倍
除草剤	ラッソー乳剤	播種直後	1	150ml/10a	

交通事故にあったら

まずは怪我人の救護と安全確保
JA共済事故受付センター(24時間・365日対応) 0120-258-931と警察にもご連絡ください