



今月  
営  
ポイ

園芸  
ポイント

梨の豊作を目指して、  
春作業を万全に行いましょう!



男鹿地区営農センター 加藤 大基

人工授粉 ～スムーズに計画的に自家採取を～

昨年、中国で火傷病が確認され、中国産花粉の輸入が停止しました。中国産花粉の輸入や国産花粉の入手は厳しく、今後は自家採取での対応をお願いいたします。また、以下の通り、実施してください。

- ①剪定時、花粉を採取するための枝を残す(豊水、長十郎、新興、二十世紀、かほり等)。
- ②葯採取機や開葯機などが正常に作動するかどうか確認する。

果樹試験場・JAにおいて授粉講習会の開催を予定しておりますので、多数ご参加いただきますようお願いいたします。

霜 ～霜に対する回避術～

昨年は天王地区や追分地区の全域、男鹿地区の一部園地で降霜による甚大な被害が発生しました。資材をよいタイミングで使用して、豊作を迎えましょう。

推奨している対策

【男鹿地区】 ①オイルヒーター ②霜ガード ③デュラフレーム

【天王地区】 ①スプリンクラーを利用した散水氷結法 ②霜ガード ③デュラフレーム

※霜ガードは開花前に散布してください。開花後に散布すると種入りが少なくなり、果実が小さくなる可能性があります。

開花時期

2月16日時点での「桜」の開花予想は4月14日(平年は4月17日、昨年は4月4日)で平年より3日早く、昨年より10日遅い状況となっています(日本気象株式会社 桜開花・満開予想(第4回)より)。和梨においても、開花時期が早まる可能性があります。

過去の強い降霜発生日 | 令和3年4月27日、令和5年4月25日

黒星病 ～黒星病断固反対!!～

1. 薬剤でできる防除

	散布時期	男鹿地区		天王地区	
		薬剤名	倍率	薬剤名	倍率
重点防除期間	発芽直後	オキシラン水和剤	600倍	オキシラン水和剤	600倍
	発芽後 2週間	トレノックスフロアブル	500倍	トレノックスフロアブル	500倍
		カナメフロアブル	4,000倍	カナメフロアブル	4,000倍
	開花直後	スコア顆粒水和剤	2,000倍	スコア顆粒水和剤	2,000倍
		ベルコート水和剤	1,000倍	ベルコート水和剤	1,000倍
	落花期	スクレアフロアブル	3,000倍	ベルコート水和剤	1,000倍
トレノックスフロアブル		500倍			

※重点防除期間は7日間隔で定期的に散布して、感染を予防しましょう。

2. 薬剤以外でできる防除

生育期間前

- 落葉を埋めるかモアで碎いてください(発芽前まで)。
- SSの走路の見直し、昨年特に発生が多かった場所は注意しましょう。

生育期間

- 発病部位はとにかく見つけ次第、速やかに取り除きましょう。

交通事故にあったら

まずは怪我人の救護と安全確保  
JA共済事故受付センター(24時間・365日対応) 0120-258-931と警察にもご連絡ください